



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Abacavir/ Lamivudin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-003		

## ☞ 藥品商品名及含量

克為滋膜衣錠 600/300 毫克 (Kivexa Film Coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療抗反轉錄病毒感染。

## ☞ 服用方式

1. 每天 1 次，每次 1 粒。
2. 請於每日固定時間整顆吞服，與食物併服或空腹使用均可，倘若胃腸不舒服建議隨餐或飯後服用。
3. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是體重小於 25 公斤、肝腎功能不良、B 型肝炎病史、心血管疾病及相關家族病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 interferon Alfa、ribavirin、zalcitabine、methadone、tipranavir。
3. 服藥期間，請定期監控全血計數、肝腎功能、電解質、血壓、血糖及血脂肪相關數值。
4. 常見副作用為頭痛、腹瀉、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應(發燒、皮疹、低血壓)、肝腫大(肝指數上升)或乳酸性酸中毒(虛弱、厭食、不明原因體重減輕、呼吸困難或呼吸促迫)。
6. 已知帶有 HLA-B\*5701 對偶基因狀態的病人，使用本藥後

發生嚴重過敏反應的風險會上升，若有基因檢測相關問題可與醫師討論。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有生殖毒性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，且不建議感染人類免疫缺乏病毒婦女哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。