



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Clarithromycin</b>	<b>口服藥</b>	

版本：TPE202309／櫃號：2023-121

## ☞ 藥品商品名及含量

**開羅理黴素膜衣錠 500 毫克/錠 (Klaricid Film-Coated Tablets)**

**幽立息膜衣錠 500 毫克/錠 (Ulicin F.C. Tablets)**

## ☞ 藥品作用

本藥為治療因細菌引發之感染

1. 治療上呼吸道感染(咽炎、鼻竇炎)
2. 治療下呼吸道感染(支氣管炎、肺炎)
3. 皮膚及軟組織感染(毛囊炎、蜂窩性組織炎)
4. 可與omeprazole並用治療與幽門螺旋桿菌有關之十二指腸潰瘍

## ☞ 服用方式

1. 通常成人每日服用 2 次，每次 1 粒，一般療程為 5-14 天。
2. 若為治療幽門螺旋桿菌，則會根據療法不同調整：

三合一療法：

clarithromycin 500 mg 併服 lansoprazole 30 mg 及 amoxicillin 1000 mg 每天二次使用 10 天。

clarithromycin 500 mg 併服 omeprazole 20 mg 及 amoxicillin 1000 mg 每天二次使用 7 到 10 天。

二合一療法：

clarithromycin 500 mg 每天三次和 omeprazole 每天 40 mg，一起服用 14 天，接下來的 14 天每天服用 omeprazole 20 mg 或 40 mg。

clarithromycin 500 mg 每天三次與 lansoprazole 每天 60 mg 一起服用 14 天。

3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。



## 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾對 azithromycin、erythromycin 等藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如其他抗生素、抗凝血劑 warfarin、BZD 類安眠藥、秋水仙素、降血脂藥物 lovastatin、simvastatin 等，可能增加藥物之作用。
3. 請告訴醫師是否有肝腎相關之疾病，以利調整藥物劑量。
4. 此藥懷孕等級為 C，若您已懷孕或計劃準備懷孕，就診時請務必告知醫師。懷孕前 3 個月內，醫師不應對懷孕婦女開立 clarithromycin。
5. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。
6. 常見的副作用為噁心、反胃、腹瀉。若出現嚴重蕁麻疹、呼吸困難等症狀，請立即就醫。