



藥物成分

劑型

櫃號

Escitalopram

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-190

☞ 藥品商品名及含量

替你憂-S 膜衣錠 10 毫克/錠 (Citao-S F.C.)

立普能膜衣錠 10 毫克/錠 (Lexapro)

☞ 藥品作用

治療及預防憂鬱症，亦適用於恐慌症、社交焦慮症、泛焦慮症及強迫症之治療。

☞ 服用方式

1. 本藥通常一日 1 次，每次 1 粒。可與食物併服或空腹服用。此藥須在規律服用數週後，才能產生效果。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是先天性 QT 間隔延長症候群(long QT syndrome)、肝腎功能不良、癲癇、躁動症、糖尿病病史者。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是 **pimozide**、**單胺氧化酶抑制劑(MAOI)**、lithium、tryptophan、抗凝血劑(包含 warfarin 及 NSAID 類藥物)、其他精神疾病相關藥物。
3. 應嚴密監視患者臨床病徵惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。
4. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
5. 常見副作用為胃部不適、改變性慾能力、嗜睡、出汗增多、頭暈、過度勞累、口乾、流鼻涕、打噴嚏，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：異常興奮、幻覺、發熱、出汗過度、精神錯亂、快速或不規則的心跳、嚴重的肌肉僵硬。

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。