



藥物成分

劑型

櫃號

Diclofenac

肛門栓劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-152

☞ 藥品商品名及含量

來克炎栓劑 12.5 毫克 (Dicloren)

普他寧栓劑 12.5 毫克 (Votalin)

☞ 藥品作用

緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。

☞ 使用方式

1. 本藥為栓劑劑型

2. 兒童 3 歲以下，每次半粒；3-5 歲，每次 1 至半粒；6-8 歲，每次 1 粒；9-11 歲，每次 1-2 粒。或依 0.5-1mg/kg 之計算，每天 1-2 次。請依醫師指示服藥。

3. 請依醫師指示服藥。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不要服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師是否有藥物過敏或其他疾病，特別是胃腸潰瘍、肛門裂瘡、直腸出血、氣喘、肝腎障礙。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Aspirin、抗凝血劑(如 warfarin)，可能增加胃腸道出血風險。

3. 本藥常見副作用為噁心、嘔吐、困倦、腹部不適、頭昏、皮膚過敏。若症狀惡化且無法忍受請就醫或回診。

4. 服藥後若發生下列症狀：胸悶、冒冷汗、呼吸困難、四肢麻痺感、血壓下降、發疹搔癢；或不明原因發燒、喉嚨痛、異常出血、瘀青、血便、嚴重胃絞痛等，請立即停藥就醫或回診。

5. 女性如有計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。於懷孕後 3 個月使用本品須特別注意(因可能造成子宮收縮無力及 / 或胎兒動脈閉鎖過早)。