



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Naltrexone/ bupropion</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-306		

## ☞ 藥品商品名及含量

**康纖芙持續性釋放錠 8/90 毫克 (Contrave Extended-Release Tablets)**

## ☞ 藥品作用

透過減少飢餓感，降低進食慾望，達到體重控制效果。

## ☞ 服用方式

1. 第一週早晨服用一錠，第二週早晚各一錠，第三週早晨服用兩錠、夜間服用一錠，第四週起早晚各兩錠。
2. 錠劑不應切割、咀嚼或弄碎。
3. 與搭配食物一起服用，但不應搭配高脂餐點。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立刻補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病和，特別是未控制高血壓、癲癇或發作病史、中樞神經系統腫瘤、躁鬱症病史、憂鬱症病史、暴食症、心因性厭食症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他含 bupropion 產品、長期使用類鴉片或鴉片藥物、單胺氧化酶抑制劑、digoxin、多巴胺類藥物、抗癲癇藥物、巴比妥類藥物、苯二氮平類藥物、抗憂鬱劑、戒菸藥品等。若需停用上述藥物時也務必告訴醫師或藥師。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的神經精神性作用。
4. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請

勿開車或操作危險機械。

5. 常見副作用為便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、暈眩、頭痛、失眠、焦慮，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：自殺行為和意念、神經精神性不良事件、癲癇發作、血壓和心跳速率上升、過敏反應(搔癢、蕁麻疹、血管性水腫、呼吸困難)、肝毒性、躁症活化、隅角閉鎖型青光眼。

7. 建議懷孕者停用此藥，體重減輕對孕婦沒有益處，且可能對胎兒有害。

8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。