



藥物成分

劑型

櫃號

Bumetanide

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-076

☞ 藥品商品名及含量

普利腫錠 1 毫克/錠 (BUDEMA)

☞ 藥品作用

是一種新合成的利尿劑，具有迅速及短暫的利尿作用，適用於各種症狀的急慢性水腫。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1~2 粒，連日或隔日使用，宜依年齡症狀增減之。
本藥須由醫師處方使用。

☞ 注意事項

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
2. 服用時需十分注意有否電解質平衡失調或脫水現象。宜少量開始投與再徐徐增量。
3. 服藥期間可能會影響體力、警覺性或判斷力，行走或工作時，請特別留意步態。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、皮膚搔癢感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 其他可能副作用：低鈉血症、低鉀血症等電解質失調及高尿酸血症、高血糖症，宜注意，若有異常則應減藥停藥。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是高血壓藥、類固醇(如：prednisone)、digoxin (Lanoxin)、indomethacin (Indocin)、lithium (Eskalith、Lithobid)、probenecid (Benemid)及 vitamins。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。