



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Prednisolone</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-358		

## ☞ 藥品商品名及含量

倍力特眼用懸浮液 1% 5毫克/瓶 (Pred Forte Ophthalmic Suspension)

復眼康眼藥水 1% 5毫克/瓶 (Prednicone Ophthalmic Suspension)

## ☞ 藥品作用

本藥為一種類固醇，用於治療眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。

## ☞ 使用方式

1. 使用前請徹底振搖，通常每天 2-4 次，每次 1-2 滴。
2. 軟膏容器尖端應避免接觸眼睛、眼瞼、手指頭等部位。
3. 使用兩種以上眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 5 分鐘。
4. 開封四周後，未用完之殘藥請丟棄。
5. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記請立即補用，但若已接近下一次時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是眼部病毒性感染、白內障、青光眼。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是類固醇、近期使用輪狀病毒疫苗。
3. 建議在點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛 2 分鐘。這可以減少點眼藥物經由眼部通道所造成的全身性吸收、因而降低全身性不良反應。
4. 本品含有氯化銨，可能被軟式隱形眼鏡吸收或發生隱形眼鏡變色。使用本藥前需先摘下隱形眼鏡，滴入 15 分鐘

後，才能重新戴上。

5. 本藥滴入後，可能會讓人感到短暫視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 用藥期間，青光眼患者應定期檢查眼內壓。
7. 常見副作用為眼睛痛、異物感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. **如果有下列症狀，請立刻就醫：視力模糊或其他視覺障礙、眼部感染。**
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示使用類固醇在動物實驗中有致畸胎性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，用藥期間不建議哺乳。