

藥物成分

劑型

櫃號

Imatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-625

☞ 藥品商品名及含量

基利克膜衣錠 100 毫克/錠 (Glivec F.C.)

癌微可膜衣錠 100 毫克/錠 (Ivic F.C.)

☞ 藥品作用

抗腫瘤標靶藥，可干擾癌細胞訊息傳遞，減緩或停止癌細胞生長，用於治療急性淋巴性白血病、侵襲式全身性肥大細胞增多症、慢性骨髓性白血病、胃腸道基質瘤或骨髓增生異常等疾病。

☞ 服用方式

1. 本藥有中度至高度致吐性，如醫師有開立止吐藥建議按時服用以預防噁心和嘔吐。
2. 通常每日 1 次，每次 4~6 粒，配合一大杯水**隨餐服用**。
3. 無法吞服膜衣錠之病人，每錠可泡在一大杯水或蘋果汁(50 毫升)中攪拌，崩解後立即服用。
4. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺疾病、肝/腎功能不良、心臟疾病、B 肝帶原。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他化療藥物如：infigratinib、或近期有施打活性疫苗如：麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗 (MMR vaccine)、小兒麻痺疫苗 (poliovirus vaccine)、傷寒疫苗 (typhoid vaccine)、水痘疫苗 (varicella virus vaccine)、黃熱病疫苗 (yellow fever vaccine)、CYP3A4 誘導劑(抗癲癇藥、巴比妥類、rifampicin、聖約翰草)、CYP3A4 抑制劑(azole 類抗黴菌藥、clarithromycin、abametapir、aprepitant、asunaprevir、

budesonide、domperidone、flibanserin、fosaprepitant、ivabradine 等)、baricitinib、BCG(inteavesical)、bosutinib、cladribine、dengue tetravalent vaccine(live)、doxorubicin、eletriptan、fexinidazole、fusidic acid(systemic)、lemborexant、lomitapide、lonafarnib、lumateperone、natalizumab、nisoldipine、pimecrolimus、pimozide、ruxolitinib、simeprevir、tacrolimus、talimogene laherparepvec、tertomotide、tofacitinib、upadacitinib、cyclosporin 或 pimozide、dihydropyridine 類鈣離子阻斷劑、statins 類膽固醇藥。

3. 本藥可能會讓人暈眩/視線模糊，**是易致跌藥物**，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁，可能會影響藥物代謝
5. 若長期使用建議定期檢測血球及肝腎功能。
6. 常見副作用為胸痛、水腫、脫髮、搔癢、腹痛、厭食、便秘、消化不良、貧血、肝毒性、感染、出血、疲倦嗜睡、頭痛、失眠、視力模糊、噁心嘔吐、腹瀉、抽筋虛弱、背痛、肌肉骨骼疼痛、血清肌酸酐升高、咳嗽、呼吸困難、鼻咽炎、咽喉痛、發燒、皮疹、，一般來說情形不嚴重，若症狀惡化請診。
7. 服藥後若發生下列症狀，請立刻就醫或回診：嚴重水腫、體重快速增加(風險隨著藥物劑量增大及病患年齡增大而增加;建議定期監測體重快速增加或體液滯留的現象，對於有心疾病或高血壓的患者或肺部疾病的患者應謹慎使用)、喘鳴/呼吸困難、血/黑便即胃腸道出血或胃腸道腫瘤出血(建議治療時開始監測胃腸道症狀)、嚴重嗜中性白血球或血小板減少(嚴重虛弱、發燒、紫斑)、黃疸(眼白/皮膚變黃)即肝毒性(開始治療之前和之後根據需要監測肝功能)。
8. 服藥期間建議採取避孕措施且不建議哺乳。