



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Tropicamide /Phenylephrine</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-441		

## ☞ 藥品商品名及含量

每瞳令－普益點眼液 0.5%/10 毫升 (Mydrin-P)

## ☞ 藥品作用

本藥為散瞳劑，用來散瞳及睫狀肌放鬆。

## ☞ 使用方式

1. 本藥為局部點眼藥，每日連續點 2~3 次，每次間隔 3~5 分鐘，每次 1~2 滴。
2. 使用前請清洗雙手，之後拉開下眼瞼，使下眼瞼成一漏斗狀。
3. 將眼藥水懸空滴入眼睛，不要讓藥瓶尖端接觸到眼球。
4. 輕閉眼睛 2~3 分鐘，並同時輕壓眼頭處鼻淚管避免藥物流入。
5. 眼藥水開封後只可使用 1 個月。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、高血壓、冠心病、糖尿病、甲狀腺機能亢進病患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是身心科用藥 MAOI 及三環抗憂鬱劑。
3. 因瞳孔會變大，眼睛會覺得模糊、光線比平常更刺眼，約 4~5 小時將會消失，請避免開車或進行危險性作業。
4. 可能的藥物副作用：紅疹、結膜炎、面部潮紅、血壓升高、口渴，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 胎兒的風險未被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。