



藥物成分

劑型

櫃號

Fentanyl

口頰片

版本：TPE202309／檔號：2023-805

## ☞ 藥品商品名及含量

平舒疼口頰溶片 200 微克/片 (Painkyl Buccal Soluble Films)

## ☞ 藥品作用

癌症病患突發性疼痛(breakthrough pain)之處置，且適用對象僅限於 18 歲(含)以上且正在使用類鴉片藥物治療其潛在持續性癌疼痛並具耐受性者。

## ☞ 使用方式

1. 每日使用劑量頻率依據醫師判斷衡量。
2. 使用前後都須先以清水洗淨雙手。
3. 首先以舌頭潤濕口腔兩頰內壁或用清水漱口。
4. 使用口頰溶片前才拆開包裝，**口頰溶片不可將切割或撕裂。**
5. 將整片口頰溶片置於一乾燥手指近指尖處(粉紅面朝上)。
6. **將口頰溶片之粉紅面貼附於口腔臉頰內壁，接壓並維持口頰溶片於固定位置上5秒**，使之固定黏貼，約在15到30分鐘內在口腔中完全溶解。
7. 未溶解前，避免觸碰或移動口頰溶片。
8. 如果醫師指示每次要使用兩片以上的口頰溶片，不可重複放置(疊放)。
9. 需貼上五分鐘後，才可飲用液體，但在口頰溶片溶解前，請勿吞嚥任何食物。
10. 每次口頰溶片之**用藥間隔至少2小時**。
11. 請依照醫囑用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項



1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對鴉片藥物不耐病人，曾經有慢性肺部疾病、肝腎功能不良、心臟疾病、酗酒習慣等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是中樞神經系統抑制劑、單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、鴉片類藥物。
3. 禁用於急性或術後疼痛之處置，包含頭痛/偏頭痛、牙痛或急診環境下使用。
4. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，屬易跌倒藥品，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
7. 常見副作用為頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、嗜睡、便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過快、意識模糊、呼吸困難(換氣不足、呼吸變慢或變淺)。
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。