

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Trihexyphenidyl HCl

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-049

## ☞ 藥品商品名及含量

班若舒錠 2 毫克 (Benzox)

瑞丹錠 2 毫克 (Switane)

## ☞ 藥品作用

改善帕金森氏症候群相關症狀，如運動困難、靜坐不能、精神無力、心情抑鬱等。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒，醫師會依照您的症狀調整劑量。
2. 請依照醫師指示服用，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，再下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物或是保健食品。
3. 請勿飲用酒類，酒類會增強此藥物的鎮靜作用。
4. 本藥可能會讓人嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為噁心、口乾、嗜睡、頭暈症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：眼壓升高。
7. 服用此藥品應緩慢調整劑量，且不可突然停藥，以達到最好療效。
8. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。