



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Travoprost/ Timolol</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-434		

## ☞ 藥品商品名及含量

複方舒壓坦點眼液 0.04 及 5 毫克/毫升 (Duotrav eye drops)

## ☞ 藥品作用

對乙型阻斷劑或前列腺素類似物眼用製劑治療反應不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓病人，用以降低其眼內壓。

## ☞ 使用方式

1. 每天早上或晚上點 1 滴於眼睛，每日同一時間使用 1 次。
2. 如忘記點藥，於下一次應點藥的時間再點藥即可。每日每眼用量勿超過 1 滴。
3. 若以複方舒壓坦點眼液取代其他抗青光眼眼用製劑，應先停用該藥，並於次日開始使用複方舒壓坦點眼液。
4. 若使用一種以上局部眼用藥，應間隔至少 5 分鐘以上，眼用藥膏須最後使用。
5. 點用藥水前，應先取下隱形眼鏡，並於點藥後 15 分鐘再重新戴上。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，如乙型阻斷劑。不建議使用於支氣管氣喘或曾有支氣管氣喘或嚴重慢性阻塞性肺病病史、角膜發育不全者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有服用其他藥物，特別是：抗糖尿病藥物、抗心律不整藥(如 quinidine、amiodarone)、抗憂鬱藥物(如 fluoxetine、paroxetine)及腎上腺素等。
3. 常見副作用為眼部充血(結膜、眼)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診；若發生視力模糊、白內障、角膜炎、黃斑部水腫、結虹膜變色、支氣管痙攣等現象，請停藥並立即就醫。

- 
4. 使用 travoprost 會使色素沉著程度逐漸上升，可能的變化包含虹膜、眼瞼及睫毛色素加深。因此不建議使用於未滿 16 歲的兒童患者。
  5. 懷孕分級為 C 級，女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師。
  6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。