



藥物成分

劑型

櫃號

Desloratadine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-143

## ☞ 藥品商品名及含量

1. 美時停敏膜衣錠錠 5 毫克/錠 (Denosin Film-Coated Tablets 5mg "Lotus")
2. "優生"治敏樂膜衣錠 5 毫克/錠 (Desora F.C. Tablets 5mg "Yu Sheng")

## ☞ 藥品作用

治療季節性過敏性鼻炎引起的相關症狀，緩解慢性原發性蕁麻疹相關症狀。

## ☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，每次 1 粒。
2. 肝腎功能不全的病人每隔一日 1 次，每次 1 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。


## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 desloratadine 引起過敏、慢性腎功能不全、肝功能不全。
2. 常見副作用為頭痛、噁心、疲勞、嗜睡、咽喉炎、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。
4. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

## ☞ 藥品儲存

1. 因本品對熱敏感，請儲存於 2-25°C 通風處，並避免暴露

臺北市立



於高 30°C 及過度潮濕的環境中。

2. 注意遵守包裝盒上註明的保存期限。