

藥物成分

劑型

櫃號

Clindamycin HCl

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-122

☞ 藥品商品名及含量

利達信 150 毫克/錠 (Lindacin Capsules)

☞ 藥品作用

本藥為治療呼吸道、皮膚、骨盆腔、陰道、腹腔感染之抗生素

☞ 服用方式

1. 通常成人每 6 小時服用一次，每次 1-3 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如抗生素 Erythromycin，可能互相拮抗其抗菌作用。
3. 請告訴醫師是否有肝腎相關之疾病，以利調整藥物劑量。
4. 此藥懷孕等級為 B，若您已懷孕或計劃準備懷孕，就診時請務必告知醫師。本藥可能會分泌到母乳哩，服藥期間不建議哺乳。
5. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。
6. 常見的副作用為噁心、反胃、腹瀉。若出現嚴重蕁麻疹、呼吸困難等症狀，請立即就醫。