



藥物成分

劑型

櫃號

Mirabegron

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-301

☞ 藥品商品名及含量

貝坦利持續性藥效錠 25 毫克/錠、50 毫克/錠 (Betmiga Prolonged-release tab)

☞ 藥品作用

治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用一次，一次一粒。
2. 可隨餐或空腹服用。
3. 錠劑應被整顆吞服，並飲用足量的水，不可嚼碎、切割或壓碎。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是高血壓、膀胱出口阻塞、末期腎病或重度肝功能不全的病人。
2. 服用此藥可能導致血壓升高，建議定期量血壓。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：抗凝血藥 warfarin、抗心律不整藥物 digoxin、flecainide、propafenone、降血壓藥 metoprolol、三環抗憂鬱劑 imipramine、desipramine、抗精神病藥 thioridazine 等。
4. 常見副作用為高血壓、鼻咽炎、尿路感染、頭痛、便秘、上呼吸道感染、關節痛、腹瀉、心搏過速、腹痛及疲倦等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 懷孕等級 C，目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已

臺北市立

聯合醫院

懷孕請告知您的醫師。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。