



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Policresulen/ Cinchocaine</b>	<b>肛門 栓劑</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-352		

## ☞ 藥品商品名及含量

宜痔平栓劑 100 毫克/2.5 毫克/粒 (Posuline Suppositories)


痔克妥栓劑 100 毫克/2.5 毫克/粒 (Faktu Suppositories)

## ☞ 藥品作用

緩解痔瘡、肛門裂傷或周圍炎的搔癢、疼痛、發炎及不適。

## ☞ 使用方式

1. 每天一到三次，每次一個，請於排便後使用。
2. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。
3. 使用方式
  - (1) 使用肛門栓劑前後需用肥皂及清水將雙手洗淨。
  - (2) 打開或撕開藥品外包裝。
  - (3) 側躺於床，一腳屈膝向前，用手將臀部抬起，露出肛門位置。



- (4) 將栓劑由尖端沿著肛門口緩緩推入，深度成人約 1~2 指節(2.5-4 公分)，嬰幼兒可推入半指節到 1 指節(1.5-2.5 公分)深度。
- (5) 塞完後臀肌用力夾住肛門至少 1 分鐘，避免栓劑被反射性排出，幼兒可用手幫忙輕夾臀部輔助，之後保持躺姿 15 分鐘。

 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是直腸結構問題或其他腸胃道疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 平時應存放於陰涼防潮處，若因炎熱變軟無法使用，可將原包裝的栓劑放在冷藏或冰水內 30 分鐘後，再去除包裝使用。
4. 栓劑塞入前可用水性潤滑劑或冷水稍微潤濕栓劑前端再塞入，但不可使用凡士林作為潤滑劑，避免影響藥效。
5. 常見副作用為輕微搔癢或黏濁液體流出，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀 請立刻就醫：肛門附近出現持續的刺激感/疼痛、腹痛或過敏反應(皮膚紅疹、搔癢、全身不適)。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。