

藥物成分

劑型

櫃號

Olanzapine

口溶錠

版本：TPE202309／檔號：2023-322

## ☞ 藥品商品名及含量

樂安神口溶錠 5 毫克 (Lanapine Orally Disintegrating Tab)

津普速口溶錠 5 毫克 (Zyprexa Zydis Orodispersible Tab)

## ☞ 藥品作用

治療思覺失調症、雙極性疾患躁期發作、預防雙極性疾患的復發。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 至 4 粒。
2. 本品口溶錠，服用時應置於口中，藥品會迅速分散於唾液中，且藥品質地易碎，故由包裝取出後應立刻服用。亦可於服用前迅速將之溶解在整杯水或合適的飲料中(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)喝下。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立刻補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病病史，如：青光眼、癲癇、肝病、攝護腺腫大、乳癌等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抑制中樞神經、抗帕金森氏症、抗心律不整之藥物。
3. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡、警覺性、協調能降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請勿吸菸，吸菸會減低此類藥物的效果。
5. 常見副作用為頭痛、焦慮不安、頭暈、便秘、口乾、胃不舒服、嘔吐、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：癲癇、無法控制的痙攣動

作、發燒、肌肉僵硬、大量流汗、心跳加速或不規則。

7. 目前對胎兒的風險不明。在服用期間，若發現懷孕或計劃懷孕，應告知醫師。由於此藥用於人體的經驗有限，只在用藥的好處遠大於可能對胎兒產生的傷害時，才可於懷孕期間用藥。

8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。