



藥物成分	劑型	櫃號
Azithromycin dihydrate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-043		

☞ 藥品商品名及含量

日舒錠 250 毫克/錠 (Zithromax Tablet)

美妥欣膜衣錠 250 毫克/錠 (Zirocin F.C. Tablet)

☞ 藥品作用

本品為廣效性抗生素，用於治療下呼吸道的感染包括支氣管炎及肺炎、皮膚及軟組織的感染、中耳炎、上呼吸道感染等。

☞ 服用方式

1. 通常一天 1 次，請依醫師指示使用，勿自行增減。
2. 可與食物併服或不併服。須整粒吞服錠劑，不可咬破、咀嚼、分開或壓碎。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟疾病、肝臟疾病、心臟疾病、心跳不規則、心臟衰竭、重症肌無力。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：免疫抑制劑(如：cyclosporine)、抗病毒藥(如：nelfinavir)、強心劑(如：digoxin)、抗癲癇藥(如：phenytoin)、麥角生物鹼類藥品、調整心律藥(如：amiodarone、disopyramide、dofetilide、procainamide、quinidine、sotalol)。
3. 本品不可與含鋁、鎂制酸劑同時併服，此二種藥品請至少間隔 2 小時使用。
4. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
5. 常見副作用為中度腹瀉、噁心、嘔吐、胃痛，但一般都不

嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻停藥並就醫：搔癢或蕁麻疹，臉或手部腫脹或紅腫，嘴或咽喉刺痛，胸悶，呼吸困難，水泡等。
7. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。