

藥物成分

劑型

櫃號

Fentanyl

貼片

版本：TPE202309／檔號：2023-806

☞ 藥品商品名及含量

吩坦尼穿皮貼片劑 25 微克/片 (Fentanyl Patch)

多瑞喜穿皮貼片 12 微公克/小時 (Fentanyl 12mcg/H)

多瑞喜穿皮貼片 75 微公克/小時 (Fentanyl 75mcg/H)

☞ 藥品作用

用於控制慢性及頑固性疼痛。

☞ 使用方式

1. 使用劑量頻率依據醫師判斷，每片可持續使用 72 小時。
2. 一般建議黏貼較無毛髮且完整的皮膚表面，如胸、背、大腿或上手臂的皮膚上。
3. 使用貼片前後都請以清水洗手。
4. 貼片不能切割或剪開，以免破壞其緩釋劑型。
5. 選定黏貼處後，先用清水清潔該處皮膚，勿用肥皂乳液或會刺激或改變膚質之物質，待皮膚完全乾燥後即可黏貼。
6. 取出貼片後，先移除背膜，黏貼儲藥部份於皮膚後，按壓約三十秒以確保貼片完全黏貼。
7. 每次更換貼片時避免貼在同一部位以避免會有過敏或刺激情況。
8. 更換下來的貼布請對黏(對折)後，放回原包裝攜回至藥局。
9. 使用貼片期間可正常沖澡，但勿泡澡或沖洗搓揉黏貼部位；貼片部位請不要以熱源直接接觸(照光或熱敷)。
10. 請依醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。
11. 如果發生貼片在使用期間脫落情形，請聯繫醫療人員。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對此藥過敏、鴉片藥物耐受情況、曾經有慢性肺部疾病、肝腎功能不全、顱內壓升高、心臟疾病、發燒等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是中樞神經系統抑制劑、ritonavir、ketoconazole、itraconazole、troleandomycin、clarithromycin、nelfinavir、nefazodone、verapamil、diltiazem 和 amiodarone、rifampicin、carbamazepine、phenobarbital、phenytoin、單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、血清素活性的藥物。
3. 本藥為緩釋劑型，所以第一次貼上時約需 12 小時後才能完全發揮止痛效果。
4. 請依藥師指示正確填寫用藥紀錄表，並於回診時提供給醫師參考，可幫助您與醫師討論疼痛控制；最後與廢棄的藥片一起攜回藥局交給藥師。
5. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，屬易跌倒藥品，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
7. 常見副作用為頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、失眠、腹瀉等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. **如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸抑制（呼吸困難或變淺變慢）。**
9. 研究未有證據顯示具致畸胎作用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。