

藥物成分

劑型

櫃號

**Antazoline phosphate/
Chlorhexidine gluconate/
Tetrahydrozoline HCL**

眼用藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-033

☞ 藥品商品名及含量

安舒敏眼藥水 0.15 /0.05/0.5 毫克/毫升 (Anzomin Eye Drops)

安敏易眼藥水 0.15 /0.05/0.5 毫克/毫升 (Alminto Eye Drops)

☞ 藥品作用

適用於緩解眼睛疲勞、眼睛過敏、結膜炎、眼膜充血。

☞ 使用方式

1. 請依照醫師指示使用。通常每天 3-4 次，每次 1-2 滴。
2. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。
3. 使用兩種眼藥(眼藥水與眼藥膏)時，請先使用藥水再使用藥膏，並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 為避免污染藥品，使用時勿使眼部碰觸至藥瓶瓶口。
4. 請避免陽光直射藥品，並儲存於 30°C 以下避光處。
5. 瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。過期之眼藥水，請勿使用。眼藥水藥液混濁、變色或出現異物時請將其丟棄。
6. 常見副作用為暫時性視力模糊及灼熱感，但一般都不嚴重，若症狀持續或惡化，無法忍受，請回診。