



藥物成分

劑型

櫃號

Oseltamivir

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-328

☞ 藥品商品名及含量

- 易剋冒膠囊 75 毫克/膠囊 (Eraflu)
克流感膠囊 75 毫克/膠囊 (Tamiflu)

☞ 藥品作用

治療或預防流行性感冒。

☞ 服用方式

1. 治療流行性感冒：每日 2 次，每次 1 粒，持續使用 5 天，未滿 40 公斤之兒童請依醫師指示服藥。
2. 預防流行性感冒：每日 1 次，每次 1 粒，持續使用 10 天，未滿 40 公斤之兒童請依醫師指示服藥。
3. 與食物併服或不併服均可。
4. 若無法吞服膠囊或需要服用較低劑量，則可於家中以膠囊配製 oseltamivir 口服懸浮液。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病 特別是中度或重度腎功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為噁心、頭痛、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：癲癇、精神錯亂。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。