



藥物成分	劑型	櫃號
Abiraterone acetate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-502		

☞ 藥品商品名及含量

澤珂錠 250 毫克/錠 (Zytiga)

阿比拉那錠 250 毫克/錠 (Abiratanat)

☞ 藥品作用

抑制睪丸、腎上腺及攝護腺腫瘤的睪固酮分泌，為治療晚期轉移性攝護腺癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 4 粒，配水整粒吞服，請勿壓碎或嚼碎本錠。
2. 服用之前至少 2 小時與服藥後至少 1 小時，不可進食。
3. 與 prednisone 或 prednisolone 必須合併使用，且不可在未諮詢醫師的情況下中斷或停止使用任一種藥物。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全、心血管疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 carbamazepine、dextromethorphan、phenobarbital、rifampin。
3. 服藥期間請避免飲酒，酒精會增加肝臟的負擔與副作用。
4. 治療期間必須持續採取避孕措施，在停止治療後亦應持續避孕一週。
5. 常見副作用為周邊水腫、低血鉀、腹瀉、高血壓、肝功能

檢驗值升高及尿道感染，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：咽喉腫脹、呼吸困難、胸痛、昏厥、心律不整。
7. 本藥物不適用於女性，懷孕等級 X，可能會對發育中的胎兒造成傷害。已懷孕或可能懷孕的婦女不可在沒有防護措施(如手套)的情況下碰觸。