

藥物成分

劑型

櫃號

Cefixime

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-101

☞ 藥品商品名及含量

"永信"喜復黴素膠囊 100 毫克 (Cefixmycin Capsules)

"信東"賜信膠囊 100 毫克 (Cexime Capsules)

☞ 藥品作用

為頭孢菌素類抗生素，抑制細菌細胞壁合成，用於治療特定細菌引起的感染症。一般用於治療泌尿系統感染及呼吸道感染。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1-2 次，每日總量 2-4 粒。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 需服用完整治療期間，不可擅自停藥。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 飯前飯後皆可服用。
2. 對頭孢菌素(Cephalosporin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有過敏反應，應避免使用。
3. 對盤尼西林(Penicillin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有交互過敏的情形，須謹慎使用。
4. 本人、父母或兄弟姊妹有易發支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質之患者，須謹慎使用。
5. 腎臟功能不全的患者，應於就診時告知醫師或詢問藥師，可能需要調整用藥方式。
6. 無法正常進食、全身狀態不良之患者或老年人，可能發生維他命 K 缺乏的情況，須謹慎觀察。
7. 同時使用 Warfarin 抗凝血劑，因 Cefixime 會抑制腸內菌

產生維他命 K，增加 Warfarin 的抗凝血作用，須謹慎觀察是否有異常出血情形。若有同時使用 Warfarin 抗凝血劑，請於就診時告知醫師。

8. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師、藥師。