



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Brinzolamide/ Brimonidine Tartrate</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-066		

## ☞ 藥品商品名及含量

**勝克壓 10 毫克/2 毫克複方點眼液 5 毫升/瓶 (Simbrinza)**

## ☞ 藥品作用

用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人病人者，以降低其眼內壓。

## ☞ 使用方式

1. 每日使用 2 次，一次使用 1 滴。(實際用法用量請遵照醫師指示)。
2. 使用前須充分振搖，讓藥水均勻混合。
3. 使用兩種以上的眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘再使用下一種眼藥水。請先使用藥水再使用藥膏。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是憂鬱症、腦血管或冠狀血管機能不全、雷氏症候群、中風、曾對磺胺類藥物有過敏紀錄者、肝腎功能不良病史等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓藥、毛地黃、乙型阻斷劑、單胺氧化酶(MAO)抑制劑、成藥、維他命、中藥或其他青光眼藥品。
3. 治療期間最好暫時勿配戴隱形眼鏡，若一定需要戴隱形眼鏡，請於點用本藥品後至少 15 分鐘再行配戴。
4. 為了保持藥物在無菌狀態，請勿碰到藥瓶的尖端。
5. 常見副作用為口中味覺異常、苦味、眼周皮膚乾燥、過敏性結膜炎、結膜充血、和眼睛搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀 請立刻就醫：視覺模糊、眼睛紅腫癢痛、皮膚變黃、起泡、脫皮、紅色皮疹。

7. 本藥可能會引起暈眩、疲倦或嗜睡症，可能使需要精神警覺性或身體協調性的工作的能力受損。