

藥物成分

劑型

櫃號

Donepezil

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-167

## ☞ 藥品商品名及含量

喜復憶膜衣錠 10 毫克 (Demenzil F.C. Tablets)

愛憶欣膜衣錠 10 毫克 (Aricept F.C Tablets)

愛憶欣膜衣錠 5 毫克 (Aricept F.C Tablets)

得憶膜衣錠 5 毫克 (Arcdone F.C. Tablets)

好思佳口腔崩散錠 5 毫克 (Arezil ODT Tab.)

多憶安口腔崩散錠 5 毫克 (Donepezil ODT Tab.)

## ☞ 藥品作用

適用於輕度-中度阿滋海默氏病之認知障礙症。

## ☞ 服用方式

1. Donepezil 是口服錠劑，通常一天服用一次，晚上睡前服用。
2. 請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
3. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 對 Donepezil 的成分過敏請勿服用。
2. 若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
3. 服用本藥應小心觀察是否出現急性或隱藏性胃腸道出血，尤其是有胃潰瘍病史或同時併服非類固醇抗發炎藥物者。
4. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：胃潰瘍、氣喘、帕金森氏症或其他的肺部疾病。
5. 可能的藥物副作用：腹瀉、噁心、嘔吐、失眠、肌肉痙攣、倦怠及食慾減退。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍

受，請回診就醫。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：消化道出血、心跳不規則、皮膚發癢、嚴重皮膚疹、呼吸或吞嚥困難、哮喘。

### 其他注意事項

1. 若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。(孕婦用藥等級：C)。
2. Donepezil 是否會被分泌至人體乳汁中尚未知悉，授乳婦女服用時應小心。