



藥物成分

劑型

櫃號

Apalutamide

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-035

☞ 藥品商品名及含量

安列康膜衣錠 60 毫克/錠 (Erleada Film-Coated Tablets)

☞ 藥品作用

適用於轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)、非轉移性的去勢抗性前列腺癌(nmCRPC)病人。

☞ 服用方式

1. 每日一次口服投予 240 毫克(4 顆 60 毫克錠劑)。本錠劑應整顆吞服。
2. 請遵照醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或服藥次數。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間（12 小時內），在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對此或其他藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您目前正在服用的藥物(包含非處方藥)或過去兩星期所服用的藥物，特別是 CYP3A4 抑制劑(如 ketoconazole 或 clarithromycin)，CYP2C8 抑制劑(如 gemfibrozil 和 trimethoprim)。
3. 應監視是否出現缺血性心臟病的徵兆與症狀。盡可能控制好心血管危險因子，如高血壓、糖尿病或血脂異常。如果發生嚴重的不良反應事件，應考慮停用。
4. 可能的藥物副作用：可能有疲倦、關節痛、皮疹、食慾降低、跌倒、體重減輕、高血壓、熱潮紅、腹瀉及骨折。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：缺血性心血管事件、骨折、癲癇發作。
6. 懷孕等級 X，女性/兒童禁用。若女性伴侶仍有生育能力的男性病人，在治療期間及使用最後一劑 Erleada 後的 3 個月內應採取有效的避孕措施、不要捐贈精子。