



藥物成分

劑型

櫃號

Oxybutynin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-331

## ☞ 藥品商品名及含量

歐舒緩釋錠 5 毫克/錠 (Oxbu Extended Release Tablet)

## ☞ 藥品作用

治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

## ☞ 服用方式

1. 每日服用一次，建議起始劑量為每次一粒，之後醫師會依據臨床情況調整劑量。
2. 可與食物併服或不併服。需要整顆吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若在平常服用的 12 小時內，請立即補服，但若已超過 12 小時，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能異常、尿滯留、胃液滯留、其他嚴重腸胃蠕動降低狀況、青光眼。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗膽鹼藥物、強效的 CYP3A4 抑制劑 (如：ketoconazole)。
3. 本藥可能會讓人昏沉嗜睡或視力模糊症狀，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為口乾、便秘、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。