

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Nicametate Citrate

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-681

## ☞ 藥品商品名及含量

暢利糖衣錠 50 毫克/錠 (Sanyl S.C. Tablets)

優庫利暖糖衣錠 50 毫克/錠 (Euclidan S.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

用於改善末梢血管循環障礙。

## ☞ 服用方式

1. 通常成人每次 1~2 錠，每日 3 次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 本藥之劑量因疾病、病人年齡而異，請依醫囑或藥袋指示服用，勿自行增減劑量。
3. 可能發生的副作用為噁心、腹痛、腹瀉、心悸、顏面潮紅、疲倦、頭暈等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 目前懷孕婦女使用 Nicametate 時之安全性尚未完全確立，懷孕或女性計畫懷孕請事先告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
5. 請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處，並存放於兒童不易取得之處所。