

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Mag. Aluminum Silicate/  
Azulene**

**口服藥**

版本：TPE202309 / 檔號：2023-284

## ☞ 藥品商品名及含量

**第一項商品未決標**

**舊商品：(暫)400/2 毫克**

## ☞ 藥品作用

用於急慢性胃炎、胃潰瘍治療。

## ☞ 服用方式

1. 成人 1 次 1 粒，飯前三十分鐘服用，1 日可服用 3 次，可嚼碎或以 1 杯溫開水溶解後服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎衰竭。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 quinolones, tetracyclines 或 digoxin。
3. 常見副作用以腸胃道為主，可能有腹瀉、便秘、脹氣、腹痛、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)，請立刻就醫。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。