



藥物成分	劑型	櫃號
Tolterodine tartrate	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-430		

☞ 藥品商品名及含量

得舒妥持續性藥效膠囊 4 毫克/膠囊(Detrusitol SR)

特洛定膜衣錠 2 毫克/錠(Terodine)

優若亭膜衣錠 2 毫克/錠(Uridin)

☞ 藥品作用

治療伴有急尿或急迫性尿失禁之膀胱過動症

☞ 服用方式

通常每日一次，每次1粒

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是控制不佳之狹角性青光眼及尿滯留。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是下列抗心律不整藥物(quinidine, procainamide, amiodarone, sotalol)，以及巨環類抗生素(erythromycin 和 clarithromycin)和抗黴菌劑(ketoconazole, itraconazole 和 miconazole)。
3. 常見副作用為口乾症、便秘、頭痛、腹痛。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏性反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、血管性水腫(嘴唇、眼睛腫脹)。
5. 懷孕等級 C，目前對人類胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，故女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。