



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Vildagliptin/ Metformin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-448		

## ☞ 藥品商品名及含量

高糖優美膜衣錠 50/850 毫克

## ☞ 藥品作用

含 2 種不同作用的口服降血糖成份，改善第二型糖尿病病人的血糖控制，治療第二型糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。
2. 與食物併服或餐後立即服用以降低腸胃道不適，如腹瀉、噁心嘔吐等。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Vildagliptin、Metformin 或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師您正在服用的藥物及病史(特別是腎臟疾病、肝臟疾病與心衰竭)。
3. 如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。
4. 發現下列症狀，請立即回診：低血糖、乳酸中毒、胰臟炎。
5. 本藥副作用包含：腸胃道不適症狀(如腹瀉、噁心、嘔吐、脹氣、腹痛)、頭痛、肌肉痛、頭暈、無力、便秘、關節痛、周邊水腫、皮膚紅腫過敏。當這些症狀嚴重或持續時，請就醫。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。