



藥物成分	劑型	櫃號
Lacidipine	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-254		

☞ 藥品商品名及含量

樂壓定膜衣錠 4 毫克/錠 (Lesyn F.C. tablet)。

樂壓定膜衣錠 6 毫克/錠 (Lesyn F.C. tablet)。

☞ 藥品作用

是一種鈣離子阻斷劑，用來治療高血壓。

☞ 服用方式

1. 起始劑量是每天一次，每次 2 毫克。經過充分時間讓效果完全發揮後，由醫師評估可將劑量增至 4 毫克，必要時可增至 6 毫克。
2. 每天必須在同一時間服用，最好在早晨服用，飯前或飯後服用皆可。
3. 可以單獨使用或與其他降血壓劑併用。
4. 未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是於最近發生過心肌梗塞、肝衰竭、腎臟病或不穩定型心絞痛者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cimetidine、cyclosporine。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的血管擴張作用，造成暈眩副作用的發生。
5. 常見副作用為：頭痛、噁心、嘔吐、眩暈、水腫、潮紅、心跳過快，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、起疹。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，但應考慮 Lacidipine 在懷孕末期可能會引起子宮肌肉鬆弛的可能性，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。