



藥物成分	劑型	櫃號
Deferasirox	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-140		

☞ 藥品商品名及含量

解鐵定膜衣錠 360 毫克/錠(Jadenu)


☞ 藥品作用

治療因輸血而導致慢性鐵質沈著症(輸血性血鐵質沉積)的成年人及2歲以上兒童患者。治療10歲以上非輸血依賴型(non-transfusion dependent)海洋性貧血患者之慢性鐵質沉著症。

☞ 服用方式

1. 因輸血而導致慢性鐵質沈著症：建議起始劑量為每日 14mg/kg。建議每個月監測血清儲鐵蛋白(serum ferritin)，必要時可依據變化趨勢，每 3 到 6 個月調整 Jadenu 劑量。劑量可逐步以 3.5~7 mg/kg 調整，並依據個別的反應及治療目標(維持或減輕鐵負荷)來調整。患者在 21 mg/kg 劑量治療下未有獲得良好控制時，可考慮使用最高達 28 mg/kg 的劑量。
2. 非輸血依賴型海洋性貧血患者之慢性鐵質沉著症：建議起始劑量為每日 7 mg/kg。建議每個月監測血清儲鐵蛋白(serum ferritin)，將過度螯合的風險降至最低。每 3 到 6 個月治療後，可考慮每次以 3.5~7 mg/kg 提高 Jadenu 劑量。不建議使用超過 14mg/kg 的劑量。
3. 應配水整顆吞服。無法吞服的病患，可磨碎加入軟質食物。每天服用一次，最好能在固定時間服用，可空腹或與輕食併服。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項



1. 老年人產生不良反應的頻率較高，老年患者應謹慎使用，應更頻繁監測不良反應。
2. Jadenu 會造成急性腎衰竭與死亡，特別是併有既有疾病及血液疾病處於惡化期的患者。開始治療前應重複兩次測量血清肌胺酸酐濃度及測定肌胺酸酐清除率，之後應每個月監測腎功能。依據血清肌胺酸酐濃度的增加，考慮降低劑量、中斷劑量、或停止用藥。
3. Jadenu 會造成肝損害，包含肝衰竭及死亡。應於開始治療前、開始治療的第一個月期間每兩週一次、以及之後，至少每個月一次測量血清轉胺酶和膽紅素濃度。重度肝功能不全者不應使用 Jadenu，中度肝功能不全者應降低劑量。
4. Jadenu 會造成胃腸道出血，可能導致死亡，特別是在患有晚期血液惡性疾病和/或血小板低下的老年患者。若有疑似胃腸潰瘍或出血的徵象和症狀時，應停用 Jadenu。
5. 常見的不良反應包括：胃腸道不適(主要為噁心、嘔吐、腹瀉、或腹痛)、皮疹、血清肌胺酸酐 (creatinine) 濃度增加。但一般都不嚴重 若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 懷孕等級 B，若計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。