



藥物成分

Mexiletine

劑型

口服藥

櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-297

☞ 藥品商品名及含量

脈律循膠囊 100 毫克/膠囊 (Meletin)

☞ 藥品作用

本藥為治療心律不整的藥物，可降低心臟神經傳導的功能，以調節心跳的規律性。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1~2 粒。
2. 應併服足夠水分且整粒吞服，最好採坐姿且飯後服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是局部麻醉劑(如 lidocaine)過敏；心肌梗塞後三個月內或心輸出量不足、心因性休克、竇房結功能不全、傳導障礙、心跳緩慢、低血壓、心衰竭、肝腎功能不全。
2. 同時服用本藥及酒精類，會影響駕駛或操作機械的能力。
3. 帕金森氏症患者服用此藥可能會加強震顫。
4. 常見副作用為消化不良、噁心嘔吐、頭暈、顫抖、視力模糊、焦慮，但一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**【史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)】**、**【心律不整惡化(心跳不規律、呼吸困難、胸痛、頭暈等)】**。
6. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。