



藥物成分	劑型	櫃號
Nitroglycerin	舌下錠	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-686		

☞ 藥品商品名及含量
耐絞寧錠 0.6 毫克/錠 (Nitrostat S.L.)

☞ 藥物作用
本藥為一種血管擴張藥物，用於緩解心絞痛發作時之症狀。

☞ 使用時機
心絞痛症狀發作時。 (請跟您的醫師確認需服用藥物的情況)。
典型的症狀為胸骨後方或心前區有壓迫緊縮感；可能會有胸痛，疼痛反射可能會延伸至左肩、手臂、右肩、頸部、下巴、上腹部或後背。

☞ 服用方式
心絞痛症狀發作時：
請坐下後在舌下放置一粒耐絞寧。 因藥品會使血管擴張而血壓下降，可能會導致輕微頭痛或暈眩。

5 分鐘後：

如果在五分鐘之內症狀並未解除，請放置第二粒耐絞寧。

10 分鐘後：

若接下來五分鐘內症狀依舊未解除，請放置第三粒耐絞寧。

15 分鐘後：

如果放置三粒耐絞寧仍依舊無法解除症狀，請立即就醫。



NTG衛教影片



若居住在偏遠地區或山區，心絞痛發作到需使用第二粒時就請立即就醫，在就醫途中時狀況若無改善，可 5 分鐘後使用第三粒。

☞ 儲存及保存期限

- 請隨身攜帶於方便可隨手拿處，須**保存室溫(20~25°C)乾燥**的環境，**原瓶保存不可分裝**。勿置於高溫潮濕的環境。
- 開瓶後若保存適當仍能存放至外包裝到期日，但因台灣區天候較屬濕熱，故建議開瓶後僅可保存使用 **6 個月**。