



藥物成分	劑型	櫃號
Dolutegravir/ Ralpivirine	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-574		

☞ 藥品商品名及含量

滋若愷膜衣錠 50 /25 毫克/錠 (Juluca F.C.)

☞ 藥品作用

本藥用於治療成人第一型人類免疫不全病毒(HIV-1)感染症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次隨餐服用 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 dolutegravir、ralpivirine 引起過敏或重度腎功能不良與末期腎病、肝臟疾病(如：B 型肝炎)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥物(carbamazepine、oxcarbazepine、phenobarbital、phenytoin)、肺結核藥物(rifampin、rifabutin)、metformin、dexamethasone、質子幫浦抑制劑、聖約翰草。
3. 制酸劑請在服用本藥 4 小時後或 6-12 小時前服用。
4. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製。
5. 常見副作用為疲倦、腹痛、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肝毒性(包括血清肝臟生化檢查數值升高及肝炎)、過敏反應(皮膚紅疹或是疑似血管性水腫)、極度疲倦、憂鬱疾患。

臺北市立

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示胎兒可能有新生兒神經管缺損的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。具生育力之女性在開始服用本藥前須進行驗孕，計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。