



藥物成分	劑型	櫃號
Macitentan	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-463		

## ☞ 藥品商品名及含量

奧欣明膜衣錠 10 毫克/錠 (Opsumit 10mg tab)

## ☞ 藥品作用

適用於原發性肺動脈高血壓。

## ☞ 服用方式

請整顆吞服，不要咀嚼、剝半或壓碎錠劑。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。

## ☞ 注意事項

1. 若忘記服藥在平常服用的 12 小時內服一粒，請盡快服用。如果超過 12 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使用，不可服用雙倍劑量。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物，特別是其他心血管治療藥物及會影響心跳、血壓之藥物。
3. 本品可能會造成胎兒傷害(懷孕等級 X)，懷孕女性請勿使用本藥。在治療期間需採用可靠避孕措施。其驗孕結果須為陰性才能開始治療，於治療期間及治療後停藥 1 個月後都避免懷孕。就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
4. 使用本品期間不建議餵母乳。
5. 水分滯留可能發生於開始使用的數週內。如果您發現任何不尋常的體重增加或是腳踝或腿部腫脹，請立即告訴醫師或藥師。

## ☞ 其他注意事項

1. 副作用並不常見，但還是可能發生。如：周邊水腫及水分滯留、貧血、肝功能異常、貧血、泌尿道感染、鼻咽炎、咽炎、支氣管炎、頭痛等。
2. 忘記服藥時請立即補服。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。