



藥物成分

劑型

櫃號

Rilpivirine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-375

## ☞ 藥品商品名及含量

恩臨膜衣錠 25 毫克/錠 (Edurant)

## ☞ 藥品作用

治療人類免疫缺乏病毒感染。

## ☞ 服用方式

1. 每天 1 次，每次隨餐服用 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肺結核、肝功能障礙、憂鬱症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥品(Carbamazepine、Oxcarbazepine、Phenobarbital、Phenytoin)、抗分枝桿菌藥物(Rifabutin、Rifampin、Rifapentine)、Dexamethasone、氫離子幫浦抑制劑、聖約翰草製劑。
3. 常見副作用為腹痛、噁心嘔吐、疲倦、頭痛、暈眩、憂鬱疾患、失眠、異常作夢、皮疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮疹或皮疹伴隨發燒、水疱、黏膜浸潤、結膜炎、臉部水腫、血管神經性水腫、肝炎、重鬱症、自殺意圖。
5. 臨床資料顯示目前沒有對胎兒有不良反應的紀錄，懷孕期間不需調整劑量，但須密切監測病毒量，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 有鑑於餵哺母乳，可能會使嬰兒感染人類免疫缺乏病毒、

臺北市立



對病毒產生抗藥性、發生不良反應的風險上升，服藥期間  
不建議哺乳。