



藥物成分	劑型	櫃號
Lacosamide	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-255		

☞ 藥品商品名及含量

維帕特膜衣錠 100 毫克/錠 (Vimpat)

☞ 藥品作用

四歲以上癲癇的單一藥物或輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每天 2 次，每次 1~2 粒。
2. 可與食物併服或不併服
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若超過平常服用時間 6 小時，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 2 或 3 級房室阻斷、中重度肝功能不全或重度腎功能不全。
2. 若您有肝、腎功能不全情形，請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 CYP3A4 或 CYP2C9 強效抑制劑，如: ketoconazole, ritonavir。
3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性、協調能力降低，故在還沒確定本藥對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為頭暈、頭痛、噁心、複視、平衡障礙、肌肉痙攣，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。目前對胎兒的風險不明，資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，除非明確需要，否則不建議於懷孕期間使用。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。