



藥物成分

劑型

櫃號

Regorafenib

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-373

## ☞ 藥品商品名及含量

癌瑞格膜衣錠 40 毫克/錠 (Stivarga F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療轉移性大腸直腸癌、腸胃道間質腫瘤、肝細胞癌

## ☞ 服用方式

1. 服藥週期為 28 天，每週期前 21 天，每日 1 次，每次 4 粒。
2. 用藥前請食用一份脂肪含量低於 30% 的低脂餐點。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是，特別是心血管疾病、肝功能不佳、B/C 肝病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑(如 warfarin)、心血管疾病用藥。
3. 服藥期間，請定期監控肝功能、血壓。
4. 常見副作用為疲倦、腹瀉、高血壓、胃腸道與腹部疼痛、皮疹、發燒與噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：手足症候群(四肢末端紅腫、水泡)、高血壓、感染、肝指數上升(疲勞、食慾不振、噁心嘔吐、黃疸)。
6. 動物實驗中有致畸胎紀錄，懷孕婦女不建議使用本藥，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。男性及女性在治療期間及施用最後一劑後 2 個月，請採取有效的避孕措施。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，在治療期間及施用最後一劑後 2 週內請勿哺餵母乳。