



藥物成分

劑型

櫃號

Baricitinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-046

☞ 藥品商品名及含量

愛滅炎膜衣錠 4 毫克/錠 (Olumiant)

☞ 藥品作用

用於有中到重度活動性類風濕性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 無法產生適當治療反應之成人病患。藥品可單獨或合併methotrexate、其他DMARDs 給予。此藥也適用於治療嚴重圓禿。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 0.5~1 粒。
2. 需每日固定一個時間，隨餐或空腹服用。
3. 通常需要整粒吞服。未經醫師指示，請勿擅自剝半藥品。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏、傳染性疾病、心臟、腦血管疾病史或其他易誘發心血管疾病的危險因子，特別是，高血壓、糖尿病、腎功能不全、家族性高膽固醇血症。
2. 請告訴醫師或是藥師您是否有在使用其他藥物，特別是probenecid 或會調節免疫系統的藥物，例如生物製劑、強效免疫抑制劑 (azathioprine 或 cyclosporine) 以及其他標靶合成抗風濕藥物。
3. 請告知醫師您是否有吸菸史，因吸菸易增加癌症和心血管不良事件發生率。
4. 常見副作用為上呼吸道感染、噁心、痤瘡、單純皰疹以及帶狀疱疹病毒感染。服藥期間若出現以下疑似感染症狀請提早回診：發燒、肌肉酸痛、呼吸急促、排尿時有灼熱或

疼痛感、皮膚出現局部紅腫熱痛。

5. 如果有以下症狀，請立刻就醫：胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、身體一邊突然發麻或無力、口齒不清、暈眩、腿部紅腫疼痛。
6. 目前尚未有藥品長期用於孕婦之臨床資料，若醫師經評估患者後研判使用之效益大於風險，經充分告知且病人同意下可使用。具有生育能力但無懷孕計畫之女性患者應採取有效避孕措施。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。