



藥物成分

劑型

櫃號

Entacapone

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-186

☞ 藥品商品名及含量

恩克帕膜衣錠 200 毫克/錠 (Entapon)

諾康停膜衣錠 200 毫克/錠 (Comtan)

☞ 藥品作用

用於治療或改善帕金森氏症，通常與其他藥物一起使用(如：levodopa)。

☞ 服用方式

1. 通常搭配其他藥物，一日服用多次，一次 1 粒，請依照醫師指示服藥。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數或擅自停藥。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有**肝臟疾病**、曾經有過抗精神病藥惡性症候群 (Neuroleptic Malignant Syndrom)、非外傷性橫紋肌溶解症 (non-traumatic rhabdomyolysis)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**抗憂鬱藥 MAO 抑制劑**該類藥品。
3. 本藥與 levodopa 併用可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為尿液變色、噁心或嘔吐、腹瀉或便秘或腹痛、口乾、失眠、幻覺、困惑、惡夢、運動困難、跌倒、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肝功能檢查異常、食慾低下、結腸炎、過敏反應(蕁麻疹、紅斑及斑丘疹)、體重減輕、出現衝動控制疾患的行為症狀(包括病態性賭博、性

慾增加、性慾亢進、強迫性消費或購物、狂食症以及強迫性進食)。

6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。