



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Amlodipine / Valsartan</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202310／檔號：2023-028		

## ☞ 藥品商品名及含量

安沛穩膜衣錠 5/160 毫克/錠劑 (Amlvlo Film-Coated Tablets)

易安穩膜衣錠 5/160 毫克/錠劑 (Exforge Film-Coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日服用 1~2 錠。
2. 可與食物併服或不併服。藥品須整粒吞服不可咬破、咀嚼、分開或壓碎。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對任何鈣離子通道阻斷劑或血管收縮素轉換酶抑制劑過敏，肝功能不良、高血鉀症、充血性心衰竭。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他降血壓藥物。
3. 本藥不能與葡萄柚（汁）或柚子併用，可能發生頭痛、臉潮紅、甚至嚴重的低血壓。
4. 常見副作用為咳嗽、頭痛、頭昏、水腫、疲勞、便秘、腹瀉、紅疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：喉頭水腫。

臺北市立

6. 在對照的動物研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良反應，但未進行人體懷孕婦女研究。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。若妳已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。