



藥物成分

劑型

櫃號

Abacavir

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-002

## ☞ 藥品商品名及含量

濟而剛錠 300 毫克/錠 (Abacavir Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療人類免疫缺乏病毒感染。

## ☞ 服用方式

1. 成人、青少年及與 25 公斤以上的兒童通常每日 1 次，每次 2 粒，或每日 2 次，每次 1 粒；三個月以上與體重小於 25 公斤的兒童，通常每日兩次，每次 0.5 粒，或每日 1 次，每次 1 粒。
2. 本藥品可飯後服用，也可空腹服用。
3. 若病人本身不適合直接服用錠劑，本藥品可在磨粉後加入少量半固體食物或液體，並儘速服用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能障礙、心血管疾病病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 服藥期間，請定期監控血壓、血糖及血脂肪相關數值。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、頭痛、疲勞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應(發燒、皮疹、低血壓)、肝腫大(肝指數上升)或乳酸性酸中毒(虛弱、厭食、不明原因體重減輕、呼吸困難或呼吸促迫)。
6. 已知帶有 HLA-B\*5701 對偶基因狀態的病人，使用本藥後發生嚴重過敏反應風險會上升，若有基因檢測相關問

題可與醫師討論。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有生殖毒性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，且不建議感染人類免疫缺乏病毒婦女哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。