



藥物成分

劑型

櫃號

Brexipiprazole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-063

## ☞ 藥品商品名及含量

銳思定 膜衣錠 1 毫克/錠 (Rexulti)

銳思定 膜衣錠 2 毫克/錠 (Rexulti)

銳思定 膜衣錠 4 毫克/錠 (Rexulti)

## ☞ 藥品作用

適用於思覺失調症。

## ☞ 服用方式

1. 此藥依每人病況進展有個人化的服法，請以醫師指示方式服藥。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病、心衰竭、心血管疾病、高膽固醇、癲癇、中風、肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是不應與 metoclopramide 併用。其他如 ketoconazole、itraconazole、clarithromycin、quinidine、bupropion、fluoxetine 等藥物併用時需評估劑量上的調整。和抗巴金森氏症藥物併用時，可能降低抗巴金森氏症藥物的療效。
3. 可能有姿勢性低血壓或影響認知與運動能力的風險，在進行需警覺性的活動(如:操作危險機器或開車)時應謹慎。
4. 常見副作用為頭暈、嗜睡、腸胃不適、焦躁不安、顫抖、肌張力不全等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診告知您的醫師。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：抗精神病藥物惡性症候群

(NMS) 的徵候或症狀(如：發高燒、肌肉僵硬、自主神經失調、精神混亂及意識改變等)、強迫性購物的衝動、增加賭博的衝動、強迫性性衝動、暴飲暴食或其他強迫性的衝動及無法控制這些衝動的可能性。

6. 臨床資料在懷孕第三期使用 REXULTI，可能引發新生兒的錐體外徑症狀或戒斷症狀紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。