



藥物成分

劑型

櫃號

Pentoxifylline

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-336

## ☞ 藥品商品名及含量

循妥斯持續性錠 400 毫克/錠 (Pentop S.R.)

福流持續釋放錠 400 毫克/錠 (Forflow S.R.)

## ☞ 藥品作用

治療末梢血管循環障礙及周邊動脈疾病(如間歇性跛行)。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 與食物併服，需要整粒吞服，不要咀嚼、壓碎或磨粉。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對咖啡因成分過敏、低血壓或血壓不穩定、腎功能不良者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin 及降血壓類藥物。
3. 如有要手術或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師您正在服用此藥。
4. 本藥可能會讓人嗜睡或頭暈或造成姿勢性低血壓，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為：噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、眩暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(搔癢、皮疹、蕁麻疹或血管神經性水腫)。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

臺北市立

8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師 /

藥師。

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

藥師

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

藥師

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

藥師