



藥物成分	劑型	櫃號
Lactic acid/ Salicylic acid	外用液	
版本：TPE202309／檔號：2023-736		

☞ 藥品商品名及含量

治疣液 16.7% Salicylic Acid + 16.7% Lactic Acid 15 毫升/
瓶 (Duofilm Liquid)

☞ 藥品作用

治疣液含水楊酸及乳酸成分，其作用係以其角質溶解作用除去被疣濾過性病毒所感染之上皮細胞。

☞ 使用方式

1. 先將疣之部位浸泡於熱水中至少 5 分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質，然後用乾毛巾擦乾。
2. 每天 1 次，使用所附的刷子，將 2~4 滴治疣液，均勻塗刷於疣之患部。
3. 塗抹第 1 滴之後，需請先待患處完全乾後，再滴第 2 滴。
4. 不可使藥水觸及正常皮膚，等藥水乾涸後可用 OK 繃或透氣膠帶輕敷於患部，以增加藥水的穿透力。
5. 治療 2-4 週，逐漸有效果。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病。糖尿病及血液循環障礙患者慎用。
2. 勿使用於黑痣、胎記、生殖器疣、臉部或黏膜部位(如眼、鼻或口)的疣，或是長毛、有紅色邊緣或顏色不尋常的疣。
3. 倘塗於疣周圍正常肌膚時會有刺激性，如暫停使用此種刺激感會消失，待無刺激感時再恢復使用，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 本品僅限外用，請勿觸及眼睛、臉部、生殖器或黏膜部位。倘若誤觸，請立刻用清水沖洗 15 分鐘。
5. 勿吸入本藥之蒸發氣體，可能造成頭昏眼花。
6. 使用本藥後，如症狀更惡化、治療 12 週後未見改善、感

覺口渴、耳鳴或耳聾、感覺生病、感覺很累、增加呼吸速率、頭暈、不正常的手腳溫灼感，請立即停止使用，並接受醫師診治。

7. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師。
8. 此藥具可燃性，請栓緊瓶蓋，並遠離火源、熱源，於室溫25°C以下陰涼處貯存，避免放置於孩童易取得之處。