



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Bromhexine</b>	<b>口服液</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-538		

## ☞ 藥品商品名及含量

氣舒痰液 2 毫克/毫升 (Bisolvon® Solution)

## ☞ 藥品作用

減少痰液粘稠度，增加痰液清除以達到祛痰及緩解咳嗽。

## ☞ 服用方式

1. 口服：每日2-3次，依醫生開立劑量使用。  
吸入：每日2次，依醫生開立劑量使用。
2. 吸入前建議將溶液溫熱至體溫，使用噴霧裝置時，以1：1生理食鹽水稀釋，為避免混和溶液產生沈澱，混和後請立即使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是對製劑其他賦形劑過敏。
2. 正以 Bromhexine 治療之病人，痰液排除可能會增加。
3. 常見副作用為：痰量增加、咳嗽可能稍微加劇、腹瀉、噁心、嘔吐及其他輕微胃腸副作用，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹及較嚴重的過敏性皮膚反應（皮膚紅疹、血管性水腫或嘴破），且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等現象。
5. 動物實驗中雖未發現生殖毒性，但謹慎起見，懷孕期間最好避免使用。本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。