



藥物成分

劑型

櫃號

Eszopiclone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-197

☞ 藥品商品名及含量

順眠膜衣錠 3 毫克/錠 (Runesda-S)

☞ 藥品作用

治療失眠症

☞ 服用方式

1. 本藥通常一天服用 1 次，每次 1 粒。
2. 每天睡前使用，服用後立即就寢。若忘記服藥可入睡則不須喚醒病人服用；於下次服藥時間服用原本劑量即可，不必服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝功能不良**、老年、虛弱病患及憂鬱症病史者。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是**中樞神經作用劑**、**抗憂鬱藥物**、抗黴菌藥、抗生素 clarithromycin 及抗病毒藥 ritonavir。
3. 服用本藥時，**不可併用酒精**及其他鎮靜藥物，會增加對心智行為的影響。
4. 服用此類安眠藥物可能出現夢遊行為，若曾經歷此類事件請主動告知醫師。
5. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
6. 常見副作用為口乾、頭昏眼花、幻覺、感染、起疹與味覺異常，其中又以味覺異常最為明顯，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. **如果有下列症狀，請立即就醫：呼吸困難、喉嚨痛、噁心、嘔吐，舌頭、聲門或喉頭部位的血管性水腫。**
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可



能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。