



藥物成分

劑型

櫃號

Doxepin HCl

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-170

## ☞ 藥品商品名及含量

可立安膠囊 25 毫克/膠囊 (Colian)

## ☞ 藥品作用


本藥為一種三環類抗憂鬱藥(TCAs)，可緩解憂鬱症及焦慮症狀，本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1-3 次，每次 1-2 粒，服藥劑量及時間可能會隨病症有所調整，請遵照醫師指示。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、前列腺肥大、尿滯留、糖尿病或是肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗憂鬱藥如單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)、其他三環類(TCAs)。
3. 本藥治療效果可能須規律服藥數周後才產生，若已長期使用突然停藥可能有戒斷症狀，請與醫師討論減量停藥。
4. 本藥可能會讓人**暈眩、嗜睡**，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，酒精可能加重副作用，**服藥期間請避免飲酒**。
5. 常見副作用可能有**頭暈、口乾、視力模糊、便秘、排尿困難、嗜睡、皮疹、消化不良、噁心、腹瀉**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

- 
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**心悸、低血壓、寒顫、不明原因發燒、抽蓄、紫斑或出血、自殺意念、嚴重過敏。**
  7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。
  8. 孩童給藥之安全性尚未確立，故不建議對 12 歲以下孩童給藥。